

Cionus hortulanus (Fourcroy), non Geoffroy

Altenahr, 6.6., 1 Exemplar auf Braunwurz (*Scrophularia nodosa*). Von den mitteleuropäischen *Cionus*-Arten besitzen drei (*alauda*, *scrophulariae*, *tuberculatus*) ein ganz besonderes Zeichnungsmuster. Sie leben alle auf Braunwurz. Die Mehrzahl der Arten mit den zwei großen schwarzen Nahtmakeln in der gelb-grünen Grundbehaarung bewohnt Königsckerzen (*Verbascum*). Obwohl *C. hortulanus* gemäß der gleichen Zeichnung in die letztere Gruppe gehört, ist er meiner Erfahrung nach häufiger auf Braunwurz als auf Königsckerzen anzutreffen. Die Entwicklung ist auf beiden Pflanzengattungen möglich. Der ähnliche, sich nur durch einen längeren Rüssel unterscheidende *C. schultzei* Reitter von der Balkan-Halbinsel und aus Anatolien (von manchen Autoren nur als geographische Unterart gewertet) lebt auf Königsckerzen. Bei dem nicht seltenen *Cionus hortulanus* hat sich eine bemerkenswerte Erweiterung des Wirtspflanzenspektrums herausgebildet.

Licinus cassideus (Fabricius) - Wiederfund für die Rheinprovinz

Von Kai Hölder, Dörrebach

L. cassideus ist in Mitteleuropa und Südosteuropa weit verbreitet, aber selten, und wurde auch schon im Kaukasus und Frankreich nachgewiesen. Von dieser, meist an xerothermen Stellen gefundene Art, liegen aus der südlichen Rheinprovinz nur drei Meldungen aus dem letzten Jahrhundert vor: Von SCHNUR aus Trier, und von SCHAUM 1860 und MÜHR 1871 jeweils aus Kreuznach. Im Mai 1913 wurde diese Art nochmals in der Zülpicher Börde bei Düren gefunden.²

Ich selbst bekam nun von dieser Art am 14.04.1988 in der Nähe von Odernheim/Glan (zwischen Meisenheim/Hunsrück und Sobernheim/Nahe) 2 Exemplare zu sehen (unter einem Stein bzw. auf einer Straße), eines davon befindet sich in meiner Sammlung. Der Hang, auf dessen Kuppe ich die beiden Käfer fing ist mehr südwestlich geneigt und oben hauptsächlich mit (Halbtrocken?) Rasen bedeckt.

²Freude, H.: Carabidae, in: Freude, H., Harde, K.W., Lohse, G.A. (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas, Band 2 (Adephaga 1), Krefeld 1976, S.256; Koch, K.: Käferfauna der Rheinprovinz, Decheniana (Bonn), Beihefte 13, 1968, S. 31.